

# LA FONCTION INVERSE

## I Définition et étude de la fonction inverse

**Définition n°1.**

La fonction inverse est la fonction  $g : \begin{cases} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^* \\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$

Rappel :  $\mathbb{R}^* = ]-\infty ; 0[ \cup ]0 ; +\infty[$

**Propriété n°1.**

La fonction inverse est impaire

*preuve :*

Notons  $g$  la fonction inverse.

Soit  $x \in \mathbb{R}^*$  (car  $D_g = \mathbb{R}^*$ )

$$g(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -g(x)$$

Ainsi  $g$  est impaire.

**Propriété n°2. Variations de la fonction inverse**

La fonction est strictement décroissante sur  $]-\infty ; 0[$  et strictement décroissante sur  $]0 ; +\infty[$

*preuve :*

▪ Démontrons la stricte décroissante sur  $]-\infty ; 0[$

Soit  $a \in ]-\infty ; 0[$  et  $b \in ]-\infty ; 0[$  tels que  $a < b$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$$

Or :  $a < b \Leftrightarrow a-b < 0 \Leftrightarrow b-a > 0$

Et comme  $a$  et  $b$  sont de même signe  $ab > 0$

D'après la règle des signes :  $\frac{b-a}{ab} > 0$

Nous venons de montrer que  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ , ce qui prouve la stricte décroissance sur  $]-\infty ; 0[$


▪ La stricte décroissance sur  $]0 ; +\infty[$  se démontre de la même façon et est laissée à titre d'exercice.

**Remarque n°1.**

Attention, la fonction inverse n'est pas strictement décroissante sur  $\mathbb{R}^* = ]-\infty ; 0[ \cup ]0 ; +\infty[$

**Propriété n°3. La représentation graphique de la fonction inverse**

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$\frac{1}{x}$			



La représentation graphique de la fonction inverse est une **hyperbole**.

# LA FONCTION INVERSE E01

## EXERCICE N°1

En utilisant le sens de variation de la fonction inverse, déterminer l'intervalle auquel appartient  $\frac{1}{x}$  dans chacun des cas suivants :

- 1)  $x \in [5 ; 20]$                       2)  $x \in [1000 ; 2000]$                       3)  $x \in [-4 ; -1]$   
4)  $x \in [-5000 ; -3000]$                       5)  $x \in [10^6 ; 10^{15}]$                       6)  $x \in \left[-\frac{3}{5} ; -\frac{1}{2}\right]$


## EXERCICE N°2

Soit  $x$  un nombre réel tel que  $\frac{1}{10} < x < 1$

Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

- 1)  $\frac{1}{x} > 10$                       2)  $1 < \frac{1}{x} \leq 10$                       3)  $0 < \frac{1}{x} < 100$

## EXERCICE N°3



Résoudre graphiquement :

- 1)  $\frac{1}{x} \leq 4$   
2)  $\frac{1}{x} \geq 2$   
3)  $\frac{1}{x} < -2$   
4)  $\frac{1}{x} > -\frac{1}{2}$

## EXERCICE N°4

Résoudre les équations suivantes pour tout réel  $x$  non nul.


- 1)  $\frac{-3}{x} = 0$                       2)  $\frac{4}{x} = \frac{3}{x} + 2$                       3)  $-\frac{5}{x} + 2 = \frac{3}{x} - 1$                       4)  $\frac{4}{x} + \frac{1}{2} = 0$

## EXERCICE N°5

Résoudre les inéquations suivantes pour tout nombre réel  $x$  non nuls.

- 1)  $\frac{2}{x} \leq 3$                       2)  $-\frac{3}{x} > 6$                       3)  $-\frac{1}{x} + 3 \geq 0$                       4)  $\frac{3}{x} + 1 \leq \frac{4}{x}$

## EXERCICE N°6



On considère un point variable  $M$  sur la branche de l'hyperbole représentant la fonction inverse définie par :

$$f(x) = \frac{1}{x} \text{ sur l'intervalle } ]0 ; +\infty[$$

Comment l'aire du rectangle grisé évolue-t-elle lorsque  $M$  se déplace sur la branche de l'hyperbole ?

# LA FONCTION INVERSE

## II Equations et inéquations quotients

**Exemple n°1.**

Résolvons dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation suivante :

$$\frac{(4x-7)(5-2x)}{3x+2} \leq 0$$

Commençons par résoudre les inéquations suivantes :

$$4x-7 > 0 \Leftrightarrow 4x > 7 \Leftrightarrow x > \frac{7}{4}$$

$$5-2x > 0 \Leftrightarrow -2x > -5 \Leftrightarrow x < \frac{5}{2}$$

$$3x+2 > 0 \Leftrightarrow 3x > -2 \Leftrightarrow x > -\frac{2}{3}$$

« >0 » Nous indique où mettre les  
« + » dans le tableau de signes

Pour la dernière ligne, on utilise la  
règle des signes.

Dressons à présent le tableau de signe suivant :

x	- ∞	- $\frac{2}{3}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{5}{2}$	+ ∞		
4x-7	-	-	0	+	+		
5-2x	+	+	+	0	-		
3x+2	-	0	+	+	+		
$\frac{(4x-7)(5-2x)}{3x+2}$	+		-	0	+	0	-

On signale les valeurs interdites

En notant  $S$  l'ensemble des solutions :

$$S = \left] -\frac{2}{3} ; \frac{7}{4} \right] \cup \left[ \frac{5}{2} ; +\infty \right[$$

**Remarque n°2.**

La méthode est la même quelque soit le nombre de facteurs au numérateur ou au dénominateur.

# LA FONCTION INVERSE

## III Complément de cours

### Définition n°2. Fonctions homographiques

Soient  $a, b, c$  et  $d$  quatre nombres réels tels que  $ad - bc \neq 0$ .

La fonction  $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$  est appelée fonction homographique.

### Remarque n°3.

Le domaine de définition est  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-d}{c} \right\} = ]-\infty ; \frac{-d}{c}[ \cup ] \frac{-d}{c} ; +\infty[$

### Propriété n°4. (admise)

Quand  $c \neq 0$  :

▪ Si  $ad - bc > 0$  alors la fonction est strictement croissante sur :

$$\left] -\infty ; \frac{-d}{c} \right[ \quad \text{et sur} \quad \left] \frac{-d}{c} ; +\infty \right[$$

▪ Si  $ad - bc < 0$  alors la fonction est strictement décroissante sur :

$$\left] -\infty ; \frac{-d}{c} \right[ \quad \text{et sur} \quad \left] \frac{-d}{c} ; +\infty \right[$$

